



# BROCHURE DESTINÉE AUX PATIENTS TRAITÉS PAR MABTHERA® (Rituximab) EN PERFUSION

- Vous trouverez dans cette brochure des informations importantes pour prévenir certains risques liés à l'utilisation de MabThera® en perfusion, notamment les risques infectieux.
- Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant de débuter votre traitement par MabThera® en perfusion.
- Gardez cette brochure, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez des questions ou des doutes, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Pour plus d'informations sur MabThera®, veuillez consulter la notice sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou sur le site de Roche [www.roche.fr](http://www.roche.fr)

## Carte de surveillance patient

- En complément de cette brochure, la **carte de surveillance du patient** dont vous trouverez un exemplaire ci-dessous contient des informations importantes de sécurité d'emploi avant, pendant et après le traitement par MabThera® que vous devez connaître.
- **Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère doit vous remettre la carte de surveillance du patient lors de chaque perfusion de MabThera®.**
- **Veillez garder la carte de surveillance du patient sur vous en permanence** (dans votre portefeuille ou dans votre sac à main).
- **Présentez cette carte lors de toute prise en charge médicale**, à tout médecin, pharmacien, infirmier/ère ou dentiste que vous consultez - et pas uniquement à votre médecin spécialiste qui vous a prescrit MabThera®.
- Informez vos proches ou le personnel soignant de votre traitement et montrez leur la carte de surveillance du patient, ceux-ci pouvant remarquer des effets indésirables dont vous-même pouvez ne pas être conscient(e).
- **Veillez garder la carte de surveillance du patient en permanence pendant les 2 années suivant la dernière administration de MabThera®.** En effet, les effets de MabThera® sur le système immunitaire peuvent durer plusieurs mois, de sorte que des effets indésirables peuvent se développer même lorsque vous ne recevez plus de traitement par MabThera®.

Emplacement Carte Patient



# SOMMAIRE

Les informations contenues dans cette brochure sont destinées aux patients qui reçoivent MabThera® pour les indications hors cancers du sang.

Vous trouverez dans ce document les réponses aux questions suivantes :

- 1. QU'EST-CE QUE MABTHERA® ?**
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT LE DÉBUT DU TRAITEMENT PAR MABTHERA® ?**
- 3. QUELS SONT LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES À SURVEILLER PENDANT ET APRÈS LE TRAITEMENT PAR MABTHERA® ?**
- 4. QUE DOIS-JE FAIRE SI JE RESSENS UN EFFET INDÉSIRABLE ?**
- 5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

## 1. QU'EST-CE QUE MABTHERA® ?

La substance active contenue dans MabThera® est le « rituximab ». Il s'agit d'un type de protéine dénommée « anticorps monoclonal ». Il se fixe à la surface de certains globules blancs du sang, appelés « lymphocytes B ». Lorsque le rituximab se fixe à la surface de cette cellule, celle-ci meurt.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de MabThera®, vous pouvez consulter la notice sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou sur le site de Roche : [www.roche.fr](http://www.roche.fr).

MabThera® est administré par perfusion dans une veine.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT LE DÉBUT DU TRAITEMENT PAR MABTHERA® EN PERFUSION ?

**Vous ne devez pas recevoir du MabThera® si l'une des situations ci-dessous s'applique à vous.**

- Vous êtes allergique au rituximab, à d'autres protéines similaires au rituximab, ou à l'un des autres composants de ce médicament.
- Vous avez actuellement une infection active sévère.
- Vous avez une faiblesse du système immunitaire.

Si vous avez des doutes, demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant que MabThera® ne vous soit administré.

**Les situations ci-dessous nécessitent que vous informiez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de recevoir MabThera® :**

### **Infections**

**Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant que MabThera® ne vous soit administré, si l'une des situations suivantes s'applique à vous ou s'est déjà appliquée à vous :**

- Si vous avez actuellement une infection (même légère, comme un rhume). Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère pourrait vous dire d'attendre la guérison de l'infection avant que l'on vous administre MabThera®.
- Si vous avez ou avez déjà eu par le passé de nombreuses infections.
- Si vous avez déjà eu une infection sévère, comme une tuberculose, une infection du sang (septicémie) ou toute autre affection affaiblissant votre système immunitaire.

- Si vous avez une affection qui peut vous rendre plus sensible aux infections graves nécessitant un traitement.

## Autres affections

**Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant que MabThera® ne vous soit administré, si l'une des situations suivantes s'applique à vous ou s'est déjà appliquée à vous :**

- Si vous avez une maladie cardiaque
- Si vous avez des problèmes respiratoires
- Si vous êtes enceinte, planifiez prochainement une grossesse ou allaitez
- Si vous avez déjà eu ou pourriez avoir actuellement une hépatite virale ou toute autre maladie du foie
- Si vous avez déjà eu des résultats anormaux lors de vos analyses de sang ou d'urine.

## Médicaments

**Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant que MabThera® ne vous soit administré, si l'une des situations suivantes s'applique à vous ou s'est déjà appliquée à vous :**

- Si vous prenez des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle.
- Si vous prenez ou avez déjà pris des médicaments susceptibles d'affecter votre système immunitaire – par exemple des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire, appelés “immunosuppresseurs”, ou certains traitements du cancer appelés chimiothérapie.
- Si vous avez déjà reçu une chimiothérapie ayant des effets sur le cœur (chimiothérapie cardiotoxique).
- Si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments. Cela inclut également les médicaments obtenus sans ordonnance.

## Vaccinations

**Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant que MabThera® ne vous soit administré, si l'une des situations suivantes s'applique à vous ou s'est déjà appliquée à vous :**

- Si vous pensez que vous avez besoin d'être vacciné(e) prochainement, notamment par un vaccin requis pour voyager dans certains pays.
- Certains vaccins ne doivent pas être administrés pendant le traitement par MabThera® ou dans les mois suivant son administration. Votre médecin vérifiera si vous avez besoin d'être vacciné(e) avant de vous administrer MabThera®.

Si vous avez des doutes, demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant que MabThera® ne vous soit administré.

### 3. QUELS SONT LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES À SURVEILLER PENDANT ET APRÈS LE TRAITEMENT PAR MABTHERA® EN PERFUSION ?

- Comme tous les médicaments, MabThera® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde et la plupart ne sont pas graves.
- Si vous recevez MabThera® en association à d'autres médicaments, certains des effets indésirables que vous pourriez présenter pourraient être dus aux autres médicaments.
- Certains effets indésirables peuvent être graves et nécessiter un traitement. Rarement, certains effets indésirables peuvent mettre en jeu le pronostic vital.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, veuillez en informer immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Gardez sur vous la liste de tous vos autres médicaments. Vous devez pouvoir la présenter lors de toute prise en charge médicale, par exemple par un médecin, un pharmacien, un(e) infirmier/ère ou un dentiste.

MabThera® affecte votre système immunitaire et peut vous rendre plus sensible aux infections. Certaines infections peuvent être graves et nécessiter un traitement.

#### Infections

**Prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère si vous présentez l'un des signes d'infection éventuels suivants :**

- température élevée (fièvre) avec ou sans frissons
- toux qui ne guérit pas
- angine
- perte de poids
- douleur sans vous être blessé(e)
- sensation générale de malaise, de fatigue ou de manque d'énergie
- sensation de brûlure en urinant.

## Infection grave du cerveau – appelée leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)

Rarement, MabThera<sup>®</sup> peut entraîner une infection grave du cerveau, appelée « leucoencéphalopathie multifocale progressive » ou LEMP. Celle-ci peut entraîner un handicap très sévère et mettre en jeu le pronostic vital.

La LEMP est provoquée par un virus. Chez la plupart des adultes en bonne santé, le virus reste inactif et il est donc inoffensif. On ne sait pas pourquoi le virus est activé chez certaines personnes, mais cela pourrait être lié à un affaiblissement du système immunitaire.

**Prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère si vous présentez l'un des signes de LEMP ci-dessous pendant le traitement par MabThera<sup>®</sup> ou jusqu'à 2 ans après la dernière administration de MabThera<sup>®</sup> :**

- confusion, perte de mémoire ou troubles de la pensée
- perte d'équilibre ou changement dans votre façon de marcher ou parler
- diminution de la force ou faiblesse d'un côté de votre corps
- trouble ou perte de la vision.

## 4. QUE DOIS-JE FAIRE SI JE RESSENS UN EFFET INDÉSIRABLE ?

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).

Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Le laboratoire reste à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.**

**Information médicale Roche**  
**Tel : 01 47 61 47 61**  
**E-mail : [paris.imp@roche.com](mailto:paris.imp@roche.com)**

© 2019 F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Les logos, images et contenu de ce document sont la propriété exclusive de F. Hoffmann La Roche Ltd et ne peuvent être reproduits ou transmis sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit exprès de F. Hoffmann La Roche Ltd, Bâle, Suisse, seul détenteur des droits de reproduction et d'utilisation.

**Roche**

30 cours de l'Île Seguin

92650 Boulogne-Billancourt cedex

Tél. : 01 47 61 40 00 - Fax : 01 47 61 77 00

[www.roche.fr](http://www.roche.fr)

MARR-MABT-19/0020 – établi le 24/04/2019